

Chirurgische bijsluiter voor mensen die een prothese (borstimplantaat) wissel ondergaan.

Bey By Bergman Clinics - Januari 2022

In deze bijsluiter leest u informatie over het vervangen van uw oude borstimplantaten (prothese wissel): waarom en wanneer, het consult, de voorbereidingen, de operatie, de periode na de behandeling, het resultaat, de eventuele complicaties en risico's. Op uw persoonlijke situatie en de mogelijkheden van een behandeling kan alleen tijdens een persoonlijk gesprek worden ingegaan. Deze bijsluiter is een voorbereiding en/of aanvulling op uw gesprek met de plastisch chirurg.

Waarom en wanneer

In de loop der tijd kan het kapsel, dat zich rond een borstimplantaat vormt, harder worden (zogenaamde kapsel contractuur). Soms leidt dit tot zichtbare vervorming van de borst, kan het pijnklachten geven en zorgt ervoor dat de borst onnatuurlijk hard kan aanvoelen.

Ook kan het zijn dat uit onderzoek van uw borsten is gebleken dat één of beide borstimplantaten kapot is/zijn. Wanneer u de zojuist genoemde problemen heeft is dat een goede reden om beide borstimplantaten te vervangen en bij kapselcontractuur het kapsel te verwijderen.

Consult

Tijdens een vrijblijvend consult met de plastisch chirurg krijgt u uitvoerig de gelegenheid om uw wensen, klachten en vragen te bespreken. De plastisch chirurg onderzoekt uw borsten, meet de huidige afmetingen van uw borst op (hoogte, breedte en cupmaat), voelt hoe hard het kapsel is en bespreekt daarna met u of een prothesewissel uw probleem voldoende kan oplossen. Vervolgens worden al uw vragen beantwoord en wordt u zo volledig mogelijk geïnformeerd over de voorbereiding, de behandeling, het te verwachten resultaat, de borstprothesen en de mogelijke complicaties. Een verkeerd beeld hiervan kan namelijk leiden tot teleurstelling. De plastisch chirurg bespreekt ook met u wanneer hij/zij niet overtuigd is dat uw probleem voldoende kan worden opgelost. Waar dit mogelijk is, stelt de arts een andere oplossing voor. Indien u wenst kunt u voor een second opinion worden doorverwezen naar een collega.

U krijgt onder andere uitleg over welke nieuwe implantaten (rond of anatomisch) gebruikt kunnen worden, met welke afmetingen en het daarbij horende volume. De afmetingen en de vorm van het nieuwe implantaat bepalen het volume en daarmee de uiteindelijke cupmaat. Omdat u reeds een borstvergroting heeft gehad is het minder goed mogelijk om de situatie met nieuwe borstimplantaten bij u te laten simuleren. Hetzij via een pasprothese of een 3D-simulatie (een drie dimensionaal beeld). Wanneer u tevreden was over het volume van uw borst zal gekozen worden voor een nieuw borstimplantaat met vergelijkbare afmetingen en volume; wanneer u toch graag wat groter of kleiner volume wenst kan er voor implantaten met andere afmetingen worden gekozen.

Cosmetische operaties worden niet vergoed. Een vergoeding voor een medisch noodzakelijke operatie is afhankelijk van de criteria die de zorgverzekeraar aan deze behandeling stelt. U kunt uw zorgverzekering en/of polisvoorwaarden raadplegen om deze criteria te achterhalen. De specialist kan niet afwijken van deze criteria. Vergoedingsregels die op dit moment gelden, kunnen veranderen in de toekomst.

Het borstimplantaat

Vorm en inhoud van de implantaten

Er zijn veel soorten implantaten die bij een borstvergroting gebruikt kunnen worden. Ze verschillen in grootte, vorm, en vulling. Meestal worden borstimplantaten gebruikt die bestaan uit een zakje van siliconenrubber, gevuld met siliconengel. Dit voelt het meest natuurlijk aan en plooit minder dan een met water oplossing gevuld borstimplantaat. Daarom kiezen de meeste vrouwen een implantaat gevuld met siliconen gel. Het implantaat kan een ronde of anatomische (druppel) vorm hebben. Meestal wordt bij een revisie van de borstimplantaten gekozen voor een rond implantaat. Het geeft vaak boven in de borst wat meer vulling en versterkt de normale vorm en eventuele draaiing geeft geen probleem (wat wel kan bij een druppelvormig implantaat, de kans hierop is bij een implantaat vervanging veel groter dan normaal, namelijk > 10%).

Grootte van de implantaten

Samen met de plastisch chirurg besluit u welke soort implantaten er gebruikt worden. Ook de grootte van het implantaat is hierbij belangrijk. Het meest natuurlijke en mooie resultaat krijgt u wanneer de nieuwe borsten één geheel vormen met uw lichaam. De grootte wordt bepaald door een aantal factoren. Vooral de huidige afmeting van uw borst (breedte en hoogte) bepaalt de grootte, maar ook de huidelasticiteit, de hoeveelheid eigen borst- en botweefsel en uw lichaamsbouw of omvang van uw borstkas. Een exacte (cup)maat van de borsten kan niet worden gegarandeerd.

Voel- en zichtbaarheid van de implantaten

Wanneer u absoluut niets meer wilt voelen van een borstimplantaat, raadt de plastisch chirurg u aan geen nieuwe borstimplantaten te gebruiken maar alleen het verwijderen te combineren met een borstlift en eventueel met lipofilling. Hierbij worden uw borsten vergroot met uit uw eigen lichaam genomen vetweefsel. We voeren dan een soort vetcel transplantatie uit waarbij vet van een bepaalde plaats van uw lichaam wordt geoogst en ingebracht in uw borsten. Het effect is vaak minder groot dan het effect van het plaatsen van nieuwe borstimplantaten maar kan prima geschikt zijn voor u.

Effecten op de gezondheid

Er bestaan veel misverstanden over het gebruik van siliconen. Wetenschappelijk onderzoek heeft niet aangetoond dat siliconen een direct schadelijk effect hebben op de gezondheid. Er bestaat geen directe relatie tussen siliconen en een verhoogde kans op borstkanker, auto-immuunziekten of andere gezondheidsklachten. Wel blijkt uit studies van de afgelopen jaren dat borstimplantaten een klein risico geven op het ontstaan van Anaplastisch Large Cell Lymfoom (ALCL), een ziekte die kwaadaardig is maar wel goed behandeld kan worden wanneer het rond een borstimplantaat ontstaat. ALCL uit zich vaak als een zwelling van de borst of in de borst. Indien u denkt dit te hebben moet u dit altijd laten onderzoeken bij de plastisch chirurg. Wanneer u een zwelling van de bost of in de borst vast stelt wil dat nog niet zeggen dat er sprake is van het ALCL, maar er bestaat een kleine kans op. Vandaar dat nader onderzoek dan echt gewenst is.

De Nederlandse Vereniging voor Plastische Chirurgie en de Gezondheidsraad zijn van mening dat een borstvergroting met siliconen implantaten een verantwoorde medische ingreep is. Zoals bij iedere andere operatie moeten de voordelen van het plaatsen van borstimplantaten goed worden afgewogen tegen de nadelen en de risico's. De plastisch chirurg zal deze uitvoering met u bespreken.

Levensduur van implantaten

De levensduur van nieuwe borstimplantaten is niet bekend. Uiteindelijk zal ook het omhulsel van het nieuwe implantaat kapotgaan. U zult daar meestal niets van merken omdat de siliconengel tegenwoordig steviger is en aanvankelijk alleen binnen het eigen lichaamskapsel (dat zich altijd vormt rond het implantaat) zal blijven. Soms krijgt u als eerste teken dat een implantaat kapot is, een opgezette lymfeklier in de oksel of in de omgeving van de borst. Wanneer dit gebeurt of wanneer bij onderzoek blijkt dat een borstimplantaat kapot is, is het verstandig de borstimplantaten te laten vervangen.

Aanvullende informatie met betrekking tot borstimplantaten is verkrijgbaar bij de fabrikanten van de desbetreffende implantaten. Als u na het lezen van deze bijsluiter nog vragen heeft of als er nog onduidelijkheden zijn kan Bey by Bergman Clinics u de bijsluiter van de fabrikant van het implantaat merk verstrekken. Die bijsluiter kan u helpen bij het maken van een weloverwogen beslissing om een borstvergroting te ondergaan.

De gebruikte implantaten zijn toegestaan door het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en voortdurend getoetst aan inzichten verkregen uit wetenschappelijke studies. Bey by Bergman Clinics en/of behandelend arts zijn niet verantwoordelijk voor eventueel optredende scheuren, beschadiging of andersoortige tekortkomingen van een implantaat, mits deze niet door toedoen van de arts / Bey by Bergman Clinics zijn veroorzaakt. Voor eventuele schadeloosstelling / schadevergoeding zowel voor directe als indirecte schade ten gevolge hiervan, dient de cliënt de fabrikant van het betreffende implantaat rechtstreeks aan te spreken en levert voor Bey by Bergman Clinics en/of behandelend arts geen verplichting op om een nieuwe operatie uit te voeren anders dan tegen de daarvoor geldende tarieven. Complicaties ten gevolge van infectie of nabloeding zijn wel voor rekening van de kliniek.

Uw eigen verantwoordelijkheden voorafgaand aan uw operatie:

In de periode voorafgaand aan uw operatie dient u rekening te houden met een aantal voorbereidingen zoals:

- Stoppen met bloedverdunners:
Als u bloedverdunnende medicijnen gebruikt kan het zijn dat u voor de operatie met deze medicatie moet stoppen. De plastisch chirurg zal u hierover informeren. Daarnaast heeft u een aantal weken voor uw operatie nog een preoperatieve screening met de anesthesiemedewerker, waarbij uw gezondheid in kaart wordt gebracht en het medicatiebeleid wordt besproken. Hierbij komt onder andere aan bod met welke bloedverdunnende medicijnen u (tijdelijk) dient te staken. Indien uw voorschrijver niet akkoord gaat met tijdelijk staken van de bloedverdunnende medicijnen, dan kan de geplande operatie niet plaatsvinden bij Bey by Bergman Clinics.
- Algemeen medicatie overzicht (AMO) inleveren:
Indien u medicijnen gebruikt is dit overzicht verkrijgbaar bij uw apotheek. Ook is er de mogelijkheid dat u ons toestemming geeft tot het delen van uw medicatiegegevens via het Landelijk Schakel Punt.
- Het toestemmingsformulier getekend inleveren:
- Dit formulier ontvangt u na het plannen van uw operatie.
- De factuur volgens de betalingsvoorwaarden* voldoen.

ALCOHOLBELEID:

- Voor een operatie geldt geen alcohol 48 uur voor de operatie en 2 weken na de operatie.

ROOKBELEID:

- Roken heeft een negatieve invloed op de wondgenezing.
- Voor een operatie geldt niet roken 4 weken voor de operatie en 4 weken na een operatie.

NAGELLAKBELEID:

- Nagellak, gel-lak en acryllak hoeven niet verwijderd te worden voor de operatie.

DRUGSBELEID:

- Gebruik van drugs zoals XTC, methamfetamine, heroïne of cocaïne dient minstens 1 week voor de operatie gestopt te worden. Dit kan namelijk ernstige hartritme stoornissen veroorzaken tijdens de operatie of kan zorgen voor een verminderde werking van anesthetica.
- Dit geldt niet voor amfetaminegebruik op recept i.v.m. AD(H)D.
- Voor cannabis gelden dezelfde regels als voor roken.

NUCHTERBELEID:

Voor het nuchterbeleid verwijzen wij u naar de anesthesiebrochure.

Wanneer de ingreep onder lokale verdoving zal worden uitgevoerd zal er:

- geen preoperatieve screening bij de anesthesie plaatsvinden
- geldt er geen nuchterbeleid

De specialist, anesthesiemedewerkers, verpleging, consulente en behandelapp kunnen u hier bij vragen verder over informeren.

Handig om voor de operatie in huis te halen:

- Paracetamol 4x daags 2 tabletten 500 mg
- Zo nodig Naproxen (Aleve) 2x daags 220-275 mg (als eerste afbouwen)
- Omeprazol 10 mg (1x daags 20 mg, bij gebruik van Naproxen), verkrijgbaar bij drogist/apotheek
- Katoenen maandverband **
- Onsteriel gaas

*** Katoenen maandverband is handig voor wondverzorging. Het neemt goed vocht op, bevat geen chemische toevoegingen, is zachter dan gaas en een goede drukverdeler onder een drukkend materiaal zoals de buikband en BH*

De operatie

- Op de dag van de operatie maakt de plastisch chirurg een tekening op uw borst.
- Daarna wordt u onder narcose gebracht en wordt vaak via het oude litteken onder de borst (vijf tot zes centimeter lang) toegang verkregen tot het kapsel en kapselholte waarna het oude implantaat verwijderd kan worden.
- Soms moet ook het oude kapsel verwijderd worden, wanneer deze heel hard geworden is of moet er meer ruimte voor het nieuwe implantaat gemaakt worden.
- Soms moet de plaats van het nieuwe implantaat veranderen van onder het borstweefsel naar achter de borstspier of zowel onder de spier aan de bovenzijde als achter de borstklier aan de onderzijde zogenaamd 'dual plane'. Dit hangt af van de oude situatie en van de dikte van de huid en het borstweefsel.
- Alleen wanneer bij de operatie ook het grootste deel van het oude kapsel wordt verwijderd, dan wordt soms aan het einde van de operatie een drain gebruik. Een drain is een slangetje met een vacuümflesje om overtollig bloed en wondvocht af te zuigen.

Wanneer u naar huis mag, dient u onder begeleiding naar huis te reizen. U mag zelf niet autorijden. Tevens adviseren wij u om de eerste 24 uur niet alleen thuis te zijn.

Na de behandeling

Na iedere behandeling zult u altijd enige pijn hebben. Dat is normaal. Tijdens dag 2 en 3 zullen de borsten pijnlijk en gezwollen aanvoelen, u kunt dan de meeste pijn verwachten. Tegen eventuele pijn kunt u de voorgeschreven pijnmedicatie nemen. Als dit onvoldoende helpt of als de pijn toeneemt, kunt u het beste contact opnemen met het nummer 088-9000535.

Herstelperiode

Vanaf de dag na de operatie mag u:

- Op de rug of op de zij slapen
- Thuis weer dagelijks douchen
- Bij doorlekken van de wond, maandverband of onsteriel gaas gebruiken
- Mobiliseren op geleide van de pijn, luister naar uw lichaam
- Uw activiteiten steeds verder uitbreiden
- 2 weken na de operatie autorijden en fietsen (dit is afhankelijk van uw verzekeringsmaatschappij)
- Na 6 weken sauna, bad, zwembad en sporten

Na de operatie krijgt u een sportbeha aangemeten.

Deze draagt u:

- De eerste 2 weken dag en nacht
- Week 3 en 4 overdag
- Week 5 en 6 facultatief, u mag dan ook een beugel/push up BH dragen

De pleister over het litteken moet u laten zitten tot de eerste controle. Het eerste jaar zult u de littekens met beschermingsfactor 30 tegen de zon moeten beschermen. Informeer bij uw specialist welke beperkingen er zijn met betrekking tot het plannen van reizen na uw ingreep.

Na de operatie komt u ter controle bij de verpleging en de specialist. Wij willen u eraan herinneren dat het belangrijk is dat u op uw controle afspraken komt. Zo kunnen de verpleegkundige en de medisch specialist de voortgang van uw herstel goed in de gaten houden. Mocht u na aanleiding van bovenstaande nog vragen hebben, dan kunnen zij u hierin begeleiden.

Het resultaat

Het kan voorkomen dat de vorm van de borsten niet meteen is zoals het uiteindelijk wordt. De borst is dan nog wat gezwollen en gespannen. Dat komt omdat het weefsel nog enige tijd nodig heeft om zich voldoende aan te passen aan de nieuwe implantaten. Tijdens de controle bij de plastisch chirurg beoordeelt u samen het resultaat van de prothesewissel. Hoe mooi of lelijk de littekens worden is niet te voorspellen. De littekens zijn in het begin vurig en rood. Na verloop van tijd verbleken de littekens. De uiteindelijke littekens zijn onder andere afhankelijk van uw aanleg tot littekenvorming en van tijd. Veranderingen in de vorm van de borst kunnen optreden als gevolg van veroudering, gewichtsverlies, gewichtstoename, zwangerschap, menopauze of andere omstandigheden. Verzakking van de borst is een natuurlijk verschijnsel dat na verloop van tijd bij alle borsten optreedt. Het is mogelijk dat u niet tevreden bent over het resultaat, omdat u er bijvoorbeeld andere verwachtingen van had. Breng dit altijd ter sprake.

Onderzoek naar knobbeltjes of andere afwijkingen in de borst blijft ook na implantaat vervanging altijd goed uitvoerbaar. De borstprothese veroorzaakt wel een schaduw op röntgenfoto's. Indien u een mammografie ondergaat moet u melden dat er protheses zijn ingebracht, soms worden er dan extra foto's gemaakt.

Complicaties en risico's

De plastisch chirurg besteedt veel tijd, zorg en persoonlijke aandacht aan uw behandeling. Toch treden helaas soms complicaties op: geen enkele ingreep is vrij van de kans op complicaties. Zo zijn er ook bij deze operatie de normale risico's van een operatie, zoals trombose, longembolie, nabloeding en wondinfectie. Ook kunnen specifieke complicaties optreden:

- De meest voorkomende complicatie na een borstimplantaat vervanging is een nabloeding (een kans van 1-2%). U krijgt dan extra zwelling en pijn. Een nabloeding gebeurt meestal binnen de eerste uren na de operatie. Als er sprake is van grote nabloeding, dan wordt u zo spoedig mogelijk weer geopereerd om het bloed te verwijderen en het bloeden te stoppen.
- Het lichaam vormt altijd een nieuw bindweefselkapsel rondom het implantaat wanneer deze bij de operatie is verwijderd. Dit kapsel gedraagt zich niet bij iedereen hetzelfde. Bij een gering aantal vrouwen (ongeveer 12%) gaat het kapsel in verloop van een aantal maanden tot jaren schrompelen, waardoor de borsten een minder fraaie vorm krijgen. Ze voelen dan onnatuurlijk en stug aan en kunnen pijnlijk zijn. Dan is soms weer een nieuwe operatie noodzakelijk.
- In zeldzame gevallen gaat ook een tweede borstimplantaat toch weer vroegtijdig kapot. Soms is dit te merken omdat er iets 'knap' in de borst of omdat de borst anders aanvoelt of van vorm is veranderd. Een kapot implantaat moet altijd vervangen worden.

- Perfecte symmetrie is van tevoren nooit aanwezig en kan ook nooit worden bereikt. Een extra operatie kan soms noodzakelijk zijn om te proberen de symmetrie te verbeteren.
- De tepels kunnen na de operatie zowel gevoeliger als minder gevoelig zijn, doordat zenuwen naar de tepel geïrriteerd zijn bij het maken van een holte voor het implantaat. Meestal herstelt het gevoel zich binnen enkele maanden. Dit is echter niet altijd het geval.
- Het implantaat kan op termijn uitzakken of juist naar boven schuiven. Dit kan met een operatie gecorrigeerd worden.
- Draaiing van een nieuw geplaatst anatomisch borstimplantaat of een draaiing van het borstimplantaat 'achterstevoren' is ook weer mogelijk in de loop der tijd. Soms kan de plastisch chirurg dit zonder operatie eenvoudig voor u oplossen met een handdraaibeweging. Lukt dit niet dan zal een operatie moeten worden uitgevoerd.
- In de borstimplantaten en in de huid van de borst kunnen voelbare of zichtbare rimpels en plooien ontstaan. Enige rimpeling is normaal en te verwachten met siliconen borstimplantaten.
- Wanneer u een infectie krijgt, dan wordt u ziek. U krijgt koorts en een rode borst. Het borstimplantaat moet dan verwijderd worden en de wond gespoeld. U zult dan enige maanden moeten wachten om opnieuw een borstvergroting te kunnen ondergaan.
- Zeer zelden treedt een allergische reactie op de verdooving of implantaat op.
- Een andere gemelde complicatie bij borstimplantaten is BIA-ALCL (Breast Implant Associated - Anaplastic Large Cell Lymphoma), ook wel ALCL genoemd. Dit is een vorm van een non-Hodgkin-lymfoom (lymfklierkanker) die kan optreden in het kapsel en vocht rondom het borstimplantaat. BIA-ALCL is te herkennen aan het relatief snel groter worden van een borst met een borstimplantaat of het krijgen van een knobbel in de borst met een borstimplantaat. In een onderzoek uit 2018 werd BIA-ALCL onderzocht voor Nederland. Vrouwen met borstimplantaten hebben een verhoogd risico op ALCL ten opzichte van vrouwen zonder borstimplantaten. Tegen de tijd dat een vrouw met een borstimplantaat 50 jaar is geworden, is de kans dat zij deze ziekte heeft gekregen ongeveer 1 op de 35.000. Dat wordt 1 op 7.000 tegen de tijd dat zij 75 jaar is. Zowel in deze studie, als in andere internationale studies lijkt BIA-ALCL vaker voor te komen bij implantaten met een grove ruwing, zogenaamde macro-getextureerde implantaten. Belangrijk is dat BIA-ALCL bij alle typen implantaten lijkt voor te komen.

Neem in ieder geval contact op na de operatie bij:

- Een gaatje in het wondgebied en er komt wondvocht uit (ook zonder koorts)
- Fors toenemende zwelling van de wond of het operatiegebied
- Pijn, als de pijnstillers niet helpen of de pijn zelfs toeneemt
- Roodheid en zwelling van de wond
- Gevoel van ziek zijn en/of koorts, hoger dan 38° (via de anus gemeten)
- Aanhoudende misselijkheid
- Acute benauwdheid op de borst
- Acute pijn in het been met eventuele zwelling
- Niet kunnen plassen, terwijl u wel normaal drinkt
- Ongerustheid of twijfel

Voor spoedgevallen zijn wij 24 uur per dag bereikbaar via 088 9000 567.

Bij geen spoed belt u tijdens kantooruren naar 088 9000 535.

Meer informatie

Als u na het lezen van deze bijsluiter nog vragen heeft kunt u deze te allen tijde stellen aan de plastisch chirurg.

U kunt hiervoor een afspraak maken op zijn spreekuur. U kunt hiervoor contact opnemen met het telefoonnummer 088 9000 535.

Klachten-en privacyreglement

Bey by Bergman Clinics beschikt over een klachten- en privacyreglement. Dit reglement is op onze locaties en via de website www.beyclinics.nl te verkrijgen.

Bedenktijd

Ook al weet u zeker dat u na het consult de ingreep wilt plannen, adviseren wij u toch om wat bedenktijd te nemen. Volgens de richtlijnen van de NVPC, waarnaar Bey by Bergman Clinics handelt, is er een “cooling off” periode. Dit is de tijd tussen het eerste consult alwaar de behandeling wordt voorgesteld en de beslissing om de behandeling door te laten gaan.

Voor een cosmetische operatieve ingreep onder algehele narcose hanteren wij een bedenktijd van 7 dagen.

Voor een cosmetische operatieve ingreep onder lokale verdoving hanteren wij een bedenktijd van 24 uur.

Betalingsvoorwaarden*

Na ontvangst van de factuur dient binnen 5 werkdagen een aanbetaling van 25% van het behandelbedrag te zijn overgemaakt. Het restant van het behandelbedrag dient uiterlijk vier weken voorafgaand aan de operatiedatum door ons te zijn ontvangen. Contante betalingen zijn alleen mogelijk na overleg met uw consulente. Indien uw operatie is goedgekeurd door uw zorgverzekeraar dan bent u zelf verantwoordelijk om uw polisvoorwaarden door te lezen om te controleren of uw operatie voor 100% vergoed wordt.

Annuleringsvoorwaarden

U dient uw operatie schriftelijk te annuleren. Bij annuleringen binnen de 3 weken voorafgaand aan uw operatie zullen de gemaakte kosten van 25% van het operatiebedrag aan u worden doorberekend. Annulering binnen 48 uur voor de afgesproken operatiedatum, is alleen mogelijk indien er sprake is van absolute en aantoonbare overmacht. In alle andere gevallen van onverzekerde zorg zal 100% van het afgesproken behandelbedrag in rekening worden gebracht. Indien er sprake is van een behandeling die wordt vergoed vanuit uw zorgverzekering geldt dat uw behandeling niet meer opnieuw kan worden gepland bij Bey by Bergman Clinics. Ook als het door het naleven van uw eigen verantwoordelijkheden, zoals benoemd in deze bijsluiters, de OK niet door kan gaan, gelden bovenstaande annuleringsvoorwaarden.

Tot slot

Deze bijsluiters is bedoeld als voorbereiding en als aanvulling op het gesprek met de plastisch chirurg en als “naslagwerk” voor de periode na de operatie. Een dergelijke beschrijving kan echter nooit volledig zijn voor iedere individuele situatie. Plastische en esthetische chirurgie is geen exacte wetenschap; u kunt aan deze geschreven informatie dan ook geen garantie ontleen betreffende het verloop en resultaat van uw behandeling.